



嚴重特殊傳染性肺炎-新型冠狀病毒(2019-nCoV)

109年2月

衛生福利部中華民國 109 年 1 月 15 日衛授疾字第 1090100030 號公告，新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為**第五類法定傳染病**。

傳播途徑

大部分的人類冠狀病毒以**直接接觸帶有病毒的分泌物、飛沫傳染**為主。有部分動物的冠狀病毒會讓動物出現腹瀉症狀，可以在糞便當中找到病毒，可能藉此造成病毒傳播。

臨床表現

常見發燒 (fever)、乾咳 (cough)、肌肉痠痛 (myalgia) 或四肢乏力 (fatigue) 等，亦出現咳嗽有痰 (productive cough)、頭痛 (headache)、咳血 (haemoptysis) 或腹瀉 (diarrhea) 等症狀。

病例定義 1

臨床條件 (具有以下任一條件)：

1. **發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)**或**急性呼吸道感染**。
2. 放射線診斷或病理學上**顯示有肺炎**。

檢驗條件 (具有以下任一條件)：

1. **臨床檢體** (如咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取液等) **鑑定出新型冠狀病毒**。
2. 臨床檢體**新型冠狀病毒分子生物學核酸檢測陽性**。

流行病學條件 (發病前 14 日內，具有下列任一個條件)：

1. **曾入境**中國湖北省 (含武漢地區)，或**曾接觸**來自湖北省 (含武漢地區) 有發燒或呼吸道症狀人士。
2. **曾有中國大陸 (不含港澳) 旅遊史**或**居住史**。
3. 曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有**密切接觸**，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。

****地區會隨疫情適時更新****

通報條件!!!

具有下列任一條件：

1. 符合**臨床條件任一項**及**流行病學條件(一)或(三)**。
2. 符合**臨床條件(二)**及**流行病學條件(二)**。
3. 符合**檢驗條件**。

診斷與治療

1. 冠狀病毒不容易以組織培養方式分離出來。PCR 為人類冠狀病毒之檢驗首選，且可研究其流行病學與病毒演化。也可採行免疫螢光抗原染色法。
2. 目前所有的冠狀病毒並無特定推薦的治療方式，多為採用**支持性療法**。

通報個案處理流程



*隔離治療通知書、自主健康管理通知書及**居家隔離通知書**由地方政府衛生局開立
#執行採檢及住院應於應於負壓病室或通風良好之單獨病室或空間執行，並依感染管制措施指引，採取適當的防護措施

如何防範

面對中國武漢肺炎 協助防疫可以怎麼做

平時養成這些習慣

- 量體溫、以肥皂勤洗手
- 減少觸摸眼鼻口
- 盡量不要到人多擁擠的公共場所

若出現發燒、咳嗽或呼吸急促症狀

務必在家休息，不要到公共場所

如有必要外出，例如：就醫

務必戴口罩、肥皂勤洗手
並妥善處理口鼻分泌物

2020/1/26 中央流行疫情指揮中心 關心您 衛生福利部疾病管制署 廣告

防範中國武漢肺炎(新型冠狀病毒) 進出醫院應配戴口罩

就醫民衆及陪病家屬

進出醫療院所
請自備口罩並全程配戴

民衆就診時，務必主動告知

發病前14日內旅遊史、
職業別、接觸史
及是否有群聚狀況(TOCC)

2020/1/27 中央流行疫情指揮中心 關心您 衛生福利部疾病管制署 廣告

口罩使用注意事項

口罩的正確使用時機

棉布印花口罩 或紗布口罩



僅能過濾較大顆粒，可作為保暖、避免灰頭土臉與鼻孔骯髒等用途，清洗後可重複使用。

活性炭口罩



可以吸附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵，**不具殺菌功能**，適合騎機車、噴漆作業、噴灑農藥等時機使用，一旦須費力呼吸或無法吸附異味時應更換。

醫用口罩 或外科口罩



一般醫療用，有呼吸道症狀、前往醫院等密閉不通風場所，或前往有呼吸道傳染病流行地區時佩戴，可阻擋大部分的5微米顆粒，應**每天更換**，但破損或弄髒應立即更換。

N95口罩



可阻擋95%以上的次微米顆粒，**適合第一線醫護人員使用**，因呼吸阻抗較高，**不適合一般民衆長時間配戴**，且應避免重複使用。

2020/1/27

中央流行疫情指揮中心 關心您



衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC

正確戴口罩4步驟

step 1



開 開包裝
檢查口罩有無破損

step 2



戴 兩端鬆緊帶掛上耳朵
鼻樑片固定在鼻樑
口罩拉開到下巴

step 3



壓 輕壓鼻樑片
讓口罩與鼻樑貼緊

step 4



密 檢查口罩和臉部
內外上下是否密合

2020/02/01

中央流行疫情指揮中心 關心您

衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC

重要訊息!!!

- ◎務必不要發布、散播、轉傳未經證實或來源不明之疫情資訊，避免觸法受重罰或刑罰。
- ◎如有發燒或呼吸道症狀者，可撥 1922 防疫專線電話。
- ◎在密閉空間時，戴一般外科口罩即可，不需戴 N95 口罩，不需要搶購和囤積口罩。
- ◎遵守中央疫情中心根據不同感染風險程度所訂的追蹤管理機制，做好應有請假。

防範中國武漢肺炎 哪些時候需要戴口罩？

1. 有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時
2. 進出醫療院所時，應全程配戴口罩
3. 出入通風不良、擁擠密閉的空間時
4. 本身有慢性疾病的人

中央流行疫情指揮中心提醒民眾：

目前我國確診個案皆為境外移入，社區尚沒有感染風險，一般**健康的民眾無須隨時配戴口罩**，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣，將口罩等物資留到真正需要的時候才使用，才不會造成物資的浪費。

資料更新日期 2020/1/27

 衛生福利部疾病管制署 廣
TAIWAN CDC 告